

QA park

問答地

無論您是巴金森病友、家屬或照顧者
無論您對巴金森病之病因、治療、照護等方面有任何疑問
都歡迎來信詢問，來信請寄：

email：irenelu1020@gmail.com

地址：台北市中山南路 7 號台大醫院研究大樓
15 樓 1507 室 神經部 呂幸樺 收

Q1. 我朋友才不到 40 歲，竟被醫師診斷為巴金森病，有可能嗎？印象中巴金森病不都是老年人的疾病嗎？

A1. 在臨床病例統計上，巴金森病患者發病的時間確實以 50 至 60 歲之間最為常見，但這不代表年輕人不會罹患此症。40 歲以前發病者統稱為「早發型巴金森症」，包括 20 歲以下即發病的少年型，及 20~40 歲之間發病的青年型。因此，年輕人如果出現巴金森症狀，請不要諱疾忌醫，應請專科醫師檢查評估。

Q2. 我兩年前獲知自己罹患巴金森病，目前服藥治療，還算穩定。近來聽說巴金森有一種新療法叫「深腦刺激術」，請問我可以嘗試嗎？

A2. 深腦刺激術 (Deep Brain Stimulation) 是巴金森治療上的一個重要突破，其治療原理是利用安全有效之電流對大腦視丘下核進行長期高頻率的電刺激，改善巴金森病導致運動失能之症狀，減輕服用藥物所產生之不正常異動。然而這種療法主要的適應對象為確定診斷罹患巴金森病達五年以上，在治療中出現藥效波動現象，或藥物導致異動症等中後期複雜藥物治療階段的患者。您被診斷為巴金森病才兩年，且服藥狀況良好，一般是不需要接受這種療法。建議您請您的巴金森醫師為您評估。

Q3. 我母親最近拿東西常常拿不穩而掉落，走路也常跌倒，請問她是得了巴金森嗎？

A3. 手部不自主顫抖是巴金森患者常見的症狀，但多半出現在手部靜止不動時，當他們伸手取物時，顫抖的現象反而會減輕。因此，你母親拿東西常掉落是否與巴金森有關，不宜冒然斷定。不過巴金森病人因平衡感較差，走路確實較常跌倒。建議您帶母親前往醫院神經科做進一步檢查。